

Заполнять только печатными буквами!

Заказчик

Пациент

Дата рождения / / М Тел./моб.: sms:

e-mail:

ФИО врача

Метаболический синдром: скрининговое первичное выявление

Метаболический синдром – состояние, при котором резко повышается риск развития сахарного диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут привести к инфаркту миокарда и инсульту.

Выявление вероятности наличия метаболического синдрома проводят для идентификации пациентов высокого риска развития указанных заболеваний в соответствии с ключевыми критериями, рекомендованными ВНОК* (Всероссийское научное общество кардиологов): окружность талии, артериальное давление, а также уровень глюкозы, триглицеридов, холестерина липопротеинов высокой и низкой плотности в сыворотке крови.

- Врачу **необходимо** ознакомиться самому и ознакомить пациента с правилами проведения исследований.
- Обязательно следует заполнить **все поля** бланка (перечень препаратов на усмотрение врача).
- Взятие крови проводится натощак (рекомендуется 12-часовой период ночного голодания).
- Исключить накануне прием алкоголя, физические и эмоциональные нагрузки.
- Не курить в течение 1 часа перед самым исследованием.
- **Артериальное давление** измеряют в состоянии покоя до взятия крови и измерения окружности талии

Артериальное давление: Систолическое мм.рт.ст. / Диастолическое мм.рт.ст.

Окружность талии: см

Исследуемый материал – сыворотка крови: пробирка с красной крышкой с гелем

МС 1	Проблемы веса: метаболический синдром (скрининговое первичное выявление) Определяемые биохимические параметры: глюкоза, триглицериды, холестерол, холестерол-ЛПВП, холестерол-ЛПНП	405 ● 🌀
------	---	---------

Специальные обозначения: ● – пробирка с красной крышкой с гелем ● 🌀 – пробирки центрифугировать через 30-45 мин. после взятия

Ограничения по применимости тестов

- Исследование **не проводится** лицам моложе 20 лет.
- Исследование клинически **нецелесообразно** выполнять пациентам с установленными диагнозами гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, сахарный диабет 2-го типа и принимающим препараты для лечения этих заболеваний.
- Исследование **не рекомендуется** выполнять пациентам, регулярно принимающим лекарственные препараты для профилактики и коррекции ранее выявленного метаболического синдрома.

Если исследование проводится по указанию направляющего врача на фоне приема лекарственных препаратов, то следует указать принимаемые пациентом лекарственные препараты:

Заполнять **ТОЛЬКО ПЕЧАТНЫМИ** буквами

С ограничениями по применимости теста ознакомлен и с правильностью заполнения бланка согласен

Объем лабораторных исследований, заказанных Пациентом согласно настоящему бланку, определен Пациентом самостоятельно, а их выполнение определяется организационно-техническими возможностями Исполнителя.

Настоящим подтверждаю, что я имел(а) возможность задавать вопросы работнику ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО», касающиеся заказанных мною лабораторных исследований, и на все вопросы получил(а) исчерпывающие ответы. Данные, указанные в настоящем бланке, являются правильными и достоверными. Преаналитические требования мною соблюдены и мне разъяснено, что несоблюдение указанных требований может повлиять на результат выполняемого лабораторного исследования.

подпись/расшифровка / / число / месяц / год

Образцы взятого у меня биологического материала маркированы сотрудником Исполнителя в моем присутствии.

Подпись пациента / / число / месяц / год

Подпись исполнителя / / число / месяц / год

/ / число / месяц / год