

<p>1. Название инструкции.</p>	<p><b>Инструкция по сбору секрета простаты, эякулята на исследования «Хламидия, определение ДНК (тест №301СП); «Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК» (тест №302СП); «Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), определение ДНК» (тест №303СП); «Гарднерелла, определение ДНК» (тест №305СП); «Гонококк, определение ДНК» (тест №306СП); «Трихомонада, определение ДНК» (тест №307СП); «Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК» (тест №308СП); «Герпесвирус человека 1-го и 2-го типов, определение ДНК» (тест №309СП); «Герпесвирус человека 1-го и 2-го типов, определение ДНК, типирование» (тест №3090СП); «Цитомегаловирус, определение ДНК» (тест №310СП); «Микобактерии туберкулеза, определение ДНК» (тест №341СП); «Уреаплазма (Ureaplasma parvum), определение ДНК» (тест №342СП); «Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum+parvum), определение ДНК» (тест №343СП); «Кандида, определение ДНК» (тест №344СП); «Бледная трепонема, определение ДНК» (тест №346СП); «Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК» (тест №351СП); «Герпесвирус человека 6-го типа, определение ДНК» (тест №352СП)</b></p>
<p>2. Информация о биоматериале и контейнере.</p>	<p>Для исследования необходима порция секрета простаты, эякулята. Контейнер необходимо заранее приобрести под залоговую стоимость в любом медицинском офисе «ИНВИТРО». Возврат залоговых средств осуществляется при сдаче анализа и при условии наличия чека за внесение залога. Контейнер для сбора биоматериала можно также приобрести в аптеке.</p>
<p>3. Информация о предварительной подготовке к исследованию.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Перед взятием секрета предстательной железы рекомендуется половое воздержание в течение не менее двух дней.</li><li>• Взятие биологического материала должно проводиться строго до начала применения антибактериальных и химиотерапевтических препаратов или не ранее, чем через 10-14 дней после их отмены (для местных антибиотиков), и не ранее, чем через один месяц после применения антибиотиков per os (перорально).</li><li>• При невозможности получить секрет сразу после массажа простаты, собирают первую порцию мочи (в которой содержится секрет предстательной железы) в количестве 15-25 мл (см. Инструкцию по сбору мочи для ПЦР исследований).</li></ul>
<p>4. Информация «куда собирать».</p>	<p>Собрать порцию секрета простаты, эякулята в стерильный контейнер с крышкой.</p>
<p>5. Информация «как собирать».</p>	<p>Самостоятельно собрать в контейнер эякулят. Сбор секрета простаты выполняется подготовленным медицинским персоналом. Контейнер для сбора секрета простаты, эякулята плотно закрыть крышкой для предотвращения протекания.</p>
<p>6. Информация о недопустимых условиях, если есть таковые.</p>	<p>Не проводить сбор биоматериала при наличии обильных гнойных выделений из уретры. Секрет простаты, эякулят, собранные в использованный ранее контейнер с крышкой, не подходят для исследования (примеси гипохлорита, моющих средств и других веществ могут исказить результат!).</p>
<p>7. Информация о том, сколько времени и в каких условиях можно хранить и транспортировать пробу от момента сбора до момента доставки в МО.</p>	<p>До отправки биоматериал должен храниться в холодильнике при +2...+8°C. Материал должен быть доставлен в медицинский офис в день сбора. При невозможности немедленной доставки в МО материал может быть сохранен при +2...+8°C не более 10-12 часов.</p>