

Инструкция по сбору эякулята, секрета простаты на исследование методом ПЦР

Взятие биологического материала должно проводиться строго до начала применения антибактериальных и химиотерапевтических препаратов или не ранее, чем через 10-14 дней после их отмены (для местных антибиотиков), и не ранее, чем через один месяц после применения антибиотиков per os (перорально).

Перед взятием секрета предстательной железы рекомендуется половое воздержание в течение не менее двух дней.

При невозможности получить секрет сразу после массажа простаты, собирают первую порцию мочи (в которой содержится секрет предстательной железы) в количестве 15-25 мл (см. Инструкцию по сбору мочи для ПЦР исследований).

Порядок сбора материала:

Необходимо заранее приобрести в любом ОМО Независимая лаборатория INVITRO или аптеке стерильный контейнер (СКК). Использовать только одноразовый контейнер.

Не проводить сбор биоматериала при наличии обильных гнойных выделений из уретры.

Самостоятельно собрать в контейнер эякулят. Сбор секрета простаты выполняется подготовленным медицинским персоналом.

Контейнер для сбора секрета простаты, эякулята плотно закрыть крышкой для предотвращения протекания.

Контейнер необходимо доставить как можно быстрее в течение нескольких часов в ближайший медицинский офис INVITRO.

До отправки биоматериал должен храниться в холодильнике при +2...+8°C.

Действует с 15.01.2019

**Инструкция по сбору эякулята, секрета простаты на исследование методом ПЦР**

Взятие биологического материала должно проводиться строго до начала применения антибактериальных и химиотерапевтических препаратов или не ранее, чем через 10-14 дней после их отмены (для местных антибиотиков), и не ранее, чем через один месяц после применения антибиотиков per os (перорально).

Перед взятием секрета предстательной железы рекомендуется половое воздержание в течение не менее двух дней.

При невозможности получить секрет сразу после массажа простаты, собирают первую порцию мочи (в которой содержится секрет предстательной железы) в количестве 15-25 мл (см. Инструкцию по сбору мочи для ПЦР исследований).

Порядок сбора материала:

Необходимо заранее приобрести в любом ОМО Независимая лаборатория INVITRO или аптеке стерильный контейнер (СКК). Использовать только одноразовый контейнер.

Не проводить сбор биоматериала при наличии обильных гнойных выделений из уретры.

Самостоятельно собрать в контейнер эякулят. Сбор секрета простаты выполняется подготовленным медицинским персоналом.

Контейнер для сбора секрета простаты, эякулята плотно закрыть крышкой для предотвращения протекания.

Контейнер необходимо доставить как можно быстрее в течение нескольких часов в ближайший медицинский офис INVITRO.

До отправки биоматериал должен храниться в холодильнике при +2...+8°C.

Действует с 15.01.2019