

Инструкция по сбору слюны на исследование методом ПЦР

Сбор слюны должен проводиться строго до начала применения антибактериальных и химиотерапевтических препаратов или не ранее, чем через 10-14 дней после их отмены (для местных антибиотиков), и не ранее, чем через один месяц после применения антибиотиков per os (перорально).

Порядок сбора материала:

Необходимо заранее приобрести в любом ОМО Независимая лаборатория ИНВИТРО или аптеке стерильный контейнер (СКК).

Для сбора слюны у детей необходима микропробирка 2 мл без транспортной среды.

Перед сбором слюны рекомендуется провести трехкратное полоскание полости рта физиологическим раствором или кипяченой водой.

Сбор слюны у детей можно проводить стерильным шприцем объемом 2-5 мл (без иглы!) из щечного пространства в микропробирку, наполнив ее слюной до половины.

Следует собрать не менее 1 мл слюны.

Плотно закрыть контейнер крышкой для предотвращения вытекания биоматериала. Микропробирку закрыть плотно до щелчка.

Контейнер необходимо доставить как можно быстрее в течение нескольких часов в ближайший медицинский офис ИНВИТРО.

До отправки биоматериал должен храниться в холодильнике при +2...+8°C.

Действует с 15.01.2019

**Инструкция по сбору слюны на исследование методом ПЦР**

Сбор слюны должен проводиться строго до начала применения антибактериальных и химиотерапевтических препаратов или не ранее, чем через 10-14 дней после их отмены (для местных антибиотиков), и не ранее, чем через один месяц после применения антибиотиков per os (перорально).

Порядок сбора материала:

Необходимо заранее приобрести в любом ОМО Независимая лаборатория ИНВИТРО или аптеке стерильный контейнер (СКК).

Для сбора слюны у детей необходима микропробирка 2 мл без транспортной среды.

Перед сбором слюны рекомендуется провести трехкратное полоскание полости рта физиологическим раствором или кипяченой водой.

Сбор слюны у детей можно проводить стерильным шприцем объемом 2-5 мл (без иглы!) из щечного пространства в микропробирку, наполнив ее слюной до половины.

Следует собрать не менее 1 мл слюны.

Плотно закрыть контейнер крышкой для предотвращения вытекания биоматериала. Микропробирку закрыть плотно до щелчка.

Контейнер необходимо доставить как можно быстрее в течение нескольких часов в ближайший медицинский офис ИНВИТРО.

До отправки биоматериал должен храниться в холодильнике при +2...+8°C.

Действует с 15.01.2019